


# 小児細菌性髄膜炎の 予防接種始めました。

ヒブワクチン&プレベナーワクチン



## 細菌性髄膜炎の原因菌と対策



- 細菌性髄膜炎の原因菌は**ヒブ菌**と**肺炎球菌**が多く全体の7割以上を占めています。
- 細菌性髄膜炎は初期診断が難しく「髄液検査」をしないと診断を確定できないため、治療が遅れてしまう可能性があります。
- 薬が効かない**耐性菌**が増えており、治療も難しくなっているため **予防接種が有効**とされています。

この予防接種のワクチンは、細菌性髄膜炎以外の感染症にも有効であり、繰り返す中耳炎や気管支炎、副鼻腔炎の方にもお奨めできるワクチンです。

### ヒブワクチン (インフルエンザ菌b型ワクチン)

#### <接種時期・スケジュール>

ヒブ菌による感染症を未然に防ぐワクチンです。世界ではすでに100カ国以上で接種されており、14年間に約1億5000万回接種されています。

#### <同時接種>

ヒブワクチンとDPTワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン(プレベナー)を別々に接種すると接種回数が多くなってしまいます。

今回導入されるヒブワクチンは、他のワクチンと同時に接種することが日本では初めて認められた画期的なワクチンです。

◆2ヶ月児～6ヶ月児……4回接種



◆7ヶ月児～11ヶ月児……3回接種



◆1歳児～4歳児……1回接種



### プレベナーワクチン (小児用肺炎球菌ワクチン)

#### <接種時期・スケジュール>

肺炎球菌による感染症を未然に防ぐワクチンです。日本では平成22年2月に認可されたばかりですが、世界では100カ国で接種され、43カ国で定期化されています。

ヒブワクチンやプレベナーは、有料で接種しなければならない任意接種の予防接種です。海外では公費で接種できる国が数多くありますが、日本で無料で接種できるようになるには、まだまだ時間がかかると考えられています。



◆2ヶ月児～6ヶ月児……4回接種



◆7ヶ月児～11ヶ月児……3回接種



◆1歳児……2回接種



◆2歳児～9歳児……1回接種



http://www.kichijimanaika.com/  
TEL (0765) 22-8825

内科・小児科・呼吸器科・胃腸科・循環器科

吉島内科クリニック